

ECHELLE DE BRADEN

Perception sensorielle

Capacité de répondre de manière adaptée à l'inconfort lié à la pression

Humidité

Degré d'humidité auquel la peau est exposée

Activité

Degré d'activité physique

Score 1

Complètement limitée

Aucune réaction (plainte, action) à la douleur, due à une diminution de la conscience ou aux effets de sédatifs.

Ou

Incapacité à sentir la douleur sur presque toute la surface du corps.

Constamment humide

La peau est presque continuellement en contact avec la transpiration, l'urine, etc. L'humidité de la peau est observée à chaque fois que le patient est tourné ou mobilisé.

Alité

Confiné au lit.

Score 2

Très limitée

Répond seulement à la douleur. Ne peut communiquer son inconfort excepté par des plaintes ou de l'agitation.

Ou

Altération de la sensibilité qui limite la capacité à sentir la douleur ou l'inconfort sur la moitié du corps.

Humide

La peau est souvent mais pas toujours humide. La literie doit être changée au moins une fois par équipe.

Limité au fauteuil

Capacité à marcher très limitée ou inexistante. Ne peut supporter son propre poids et/ou doit être aidé au fauteuil ou fauteuil roulant.

Score 3

Légèrement limitées

Répond aux commandes verbales, mais ne peut pas toujours communiquer son inconfort

Ou

Son besoin d'être tourné.

Ou

A une sensibilité diminuée qui limite sa capacité à sentir la douleur ou l'inconfort à l'un des deux membres inférieurs ou aux deux.

Occasionnellement humide

La peau est occasionnellement humide, un changement de la literie est nécessaire environ une fois par jour.

Marche occasionnelle

Marche occasionnellement durant la journée mais sur de petites distances avec ou sans aide. Passe la grande majorité du temps au lit ou au fauteuil.

Score 4

Aucune diminution

Répond aux commandes verbales. N'a aucun déficit sensoriel qui limite sa capacité à sentir et à exprimer sa douleur et son inconfort.

Rarement humide

La peau est généralement sèche. La literie est changée selon les habitudes de l'équipe.

Marche fréquemment

Marche en dehors de sa chambre au moins 2 fois par jour et dans sa chambre au moins une fois toutes les 2 heures durant la journée.

	Mobilité Capacité à changer et à contrôler la position du corps	Nutrition Habitudes alimentaires	Friction et cisaillement
Score 1	Complètement immobile Ne peut effectuer le moindre changement de position du corps ou de ses extrémités sans aide.	Très pauvre Ne mange jamais un repas complet. Mange rarement plus du tiers des aliments proposés. Mange 2 rations de protéines ou moins par jour (viande ou produits laitiers). Boit peu. Ne prend pas de suppléments alimentaires liquides. Ou Est à jeun et/ou est hydraté par voie orale ou intraveineuse depuis plus de cinq jours.	Problème Requiert une assistance modérée à complète pour se mobiliser. Se relever complètement dans le lit sans glisser sur les draps est impossible. Glisse fréquemment dans le lit ou le fauteuil, nécessite de fréquents repositionnements avec un maximum d'aide. Spasticité, contractures, ou agitation provoquent presque constamment des frictions.
Score 2	Très limitée Effectue occasionnellement de légers changements de position du corps et de ses extrémités mais incapacité à effectuer de manière autonome de fréquents et importants changements de position.	Probablement inadéquate mange rarement un repas complet et mange en général seulement la moitié des aliments proposés. Prend seulement 3 rations de viande ou de produits laitiers par jour. Peut prendre occasionnellement un supplément diététique. Ou Reçoit moins que la quantité optimale requise par un régime liquide ou par sonde.	Problème potentiel Se mobilise difficilement ou requiert un minimum d'aide pour le faire. Durant le transfert, la peau glisse contre les draps, la chaise, les contentions ou autres appareillages. Garde la plupart du temps une relative bonne position au fauteuil ou au lit, mais glisse occasionnellement vers le bas.
Score 3	Légèrement limitée Effectue seul de fréquents petits changements de position du corps et de ses extrémités.	Adéquate Mange plus de la moitié des repas. Mange 4 rations de protéines (viande, produits laitiers) par jour. Refuse occasionnellement un repas, mais généralement prend un supplément alimentaire s'il est proposé. OU Est alimenté par sonde ou nutrition parentérale, adaptée à la plupart de ses besoins nutritionnels.	Aucun problème apparent Se mobilise seul au lit et au fauteuil et a suffisamment de force musculaire pour se soulever complètement durant le transfert. Garde en tout temps une bonne position au lit et au fauteuil.
Score 4	Aucune limitation Effectue des changements de position majeurs et fréquents sans aide.	Excellente Mange presque la totalité de chaque repas. Ne refuse jamais un repas. Prend habituellement au moins quatre rations de viande ou de produits laitiers par jour. Mange occasionnellement entre les repas. Ne requiert aucun supplément alimentaire.	 annoSanté VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL

RISQUE FAIBLE DE 23 À 18 / RISQUE MODÉRÉ DE 17 À 14 / RISQUE ÉLEVÉ DE 13 À 9 / RISQUE TRÈS ÉLEVÉ DE 8 À 6